



Mønsted's skadestue kompendium

Diagnose	Hovedtraume																																																							
<p>Se diagnose tabel på sidste side</p>	<p>For vurdering af voksne med hovedtraumer henvises der til AUH E-dok instruks: TBI: Hovedtraume. Visitation og observation</p> <p>Lommeuide:</p> <p>Visitation af voksne (≥ 18 år) med et hovedtraume indenfor 24 timer</p> <p><small>Modificeret anbefaling fra Skandinavisk Neurotraumekomité</small></p> <p><small>Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B; Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC). Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. BMC Med 2013;11:50-67</small></p> <p><small>Eskenen V, Springborg JB, Undén J & Romner B. Håndtering af minimale, lette og moderate hovedtraumer hos voksne Ugeskr Læger 2014; 176:V09130559</small></p>																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Glasgow Coma Skala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Øjenåbning</td> </tr> <tr> <td>• Spontant åbne</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• På titale</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>• På smertestimulation</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>• Ingen</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verbalt respons</td> </tr> <tr> <td>• Orienteret (egne data, tid og sted)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Konfus, desorienteret</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• Usammenhængende, men forståelige ord</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>• Uforståelige ord eller grynt</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>• Intet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Motorisk respons</td> </tr> <tr> <td>• Efterkommer opfordringer</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>• Lokaliserer</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>• Afværger (flekterer)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• Abnorm fleksion med pronation af hånd</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>• Ekstension med pronation af hånd</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>• Intet</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Total score (GCS)</td> <td>3-15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observation under indlæggelse</td> </tr> <tr> <td>• Bevidsthedsplan (GCS)</td> <td rowspan="4"> Forværring af tilstanden Ved UDVIKLING af • GCS-fald på 2 eller mere • Pupillnormit(er) • Fokale neurologiske udfald ↓ AKUT CT-SCANNING </td> </tr> <tr> <td>• Pupillforhold (størrelse-lysreaktion)</td> </tr> <tr> <td>• Ekstremitetsmotorik (normal-parese)</td> </tr> <tr> <td>• BT, puls og respiration (pulsximetri)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observationsintervaller</td> </tr> <tr> <td>• Første 4 timer: Hvert kvarter</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• 4-8 timer: Hver halve time</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• 8-12-24 timer: Hver time</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Glasgow Coma Skala		Øjenåbning		• Spontant åbne	4	• På titale	3	• På smertestimulation	2	• Ingen	1	Verbalt respons		• Orienteret (egne data, tid og sted)	5	• Konfus, desorienteret	4	• Usammenhængende, men forståelige ord	3	• Uforståelige ord eller grynt	2	• Intet	1	Motorisk respons		• Efterkommer opfordringer	6	• Lokaliserer	5	• Afværger (flekterer)	4	• Abnorm fleksion med pronation af hånd	3	• Ekstension med pronation af hånd	2	• Intet	1	Total score (GCS)	3-15	Observation under indlæggelse		• Bevidsthedsplan (GCS)	Forværring af tilstanden Ved UDVIKLING af • GCS-fald på 2 eller mere • Pupillnormit(er) • Fokale neurologiske udfald ↓ AKUT CT-SCANNING	• Pupillforhold (størrelse-lysreaktion)	• Ekstremitetsmotorik (normal-parese)	• BT, puls og respiration (pulsximetri)	Observationsintervaller		• Første 4 timer: Hvert kvarter		• 4-8 timer: Hver halve time		• 8-12-24 timer: Hver time	
Glasgow Coma Skala																																																								
Øjenåbning																																																								
• Spontant åbne	4																																																							
• På titale	3																																																							
• På smertestimulation	2																																																							
• Ingen	1																																																							
Verbalt respons																																																								
• Orienteret (egne data, tid og sted)	5																																																							
• Konfus, desorienteret	4																																																							
• Usammenhængende, men forståelige ord	3																																																							
• Uforståelige ord eller grynt	2																																																							
• Intet	1																																																							
Motorisk respons																																																								
• Efterkommer opfordringer	6																																																							
• Lokaliserer	5																																																							
• Afværger (flekterer)	4																																																							
• Abnorm fleksion med pronation af hånd	3																																																							
• Ekstension med pronation af hånd	2																																																							
• Intet	1																																																							
Total score (GCS)	3-15																																																							
Observation under indlæggelse																																																								
• Bevidsthedsplan (GCS)	Forværring af tilstanden Ved UDVIKLING af • GCS-fald på 2 eller mere • Pupillnormit(er) • Fokale neurologiske udfald ↓ AKUT CT-SCANNING																																																							
• Pupillforhold (størrelse-lysreaktion)																																																								
• Ekstremitetsmotorik (normal-parese)																																																								
• BT, puls og respiration (pulsximetri)																																																								
Observationsintervaller																																																								
• Første 4 timer: Hvert kvarter																																																								
• 4-8 timer: Hver halve time																																																								
• 8-12-24 timer: Hver time																																																								