

Antibiotikabehandling ved etableret infektion

- Kirurgisk behandling hvis nødvendigt.
- I svære tilfælde startes i.v. behandling. I lettere tilfælde er peroral behandling tilstrækkelig.
- Antibiotikaregime til voksne vælges jf. Tabel 1
- Antibiotikadoser til børn og ved allergi:
<https://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/318539#>

Tabel 1: Antibiotika regimer i forbindelse med bidsår voksne

Dyreart	Antibiotikaprofylakse (engangs dosis – gives maks. 2-3 timer efter bid)	Antibiotikaprofylakse (3 døgns peroral – gives så vidt muligt inden for 8 timer efter bid)	Empirisk behandling ved etableret infektion (Behandlingsvarighed 10 døgns, dog 14 døgns ved sælbid)
Hunde, katte og gnavere	PenicillinG 2 MIE i.v. Penicillinallergi: Ceftriaxon 1 g i.v.	PenicillinV 1 MIE x 3 p.o. Penicillinallergi: Moxifloxacin 400 mg p.o.	PenicillinG 2MIE x 3-4 i.v. PenicillinV 1 MIE x 3 p.o. Penicillinallergi: Ceftriaxon 1 g x 1 i.v. Moxifloxacin 400 mg x 1 p.o.
Menneske	Penicillin 2 MIE i.v. + cloxacillin 2 g i.v. Penicillinallergi: Ceftriaxon 1 g i.v.	Amoxicillin/clavulansyre 500 mg x 3 p.o. Penicillinallergi: moxifloxacin 400 mg x 1 p.o.	PenicillinG 2MIE x 3-4 i.v. + cloxacillin 1 g x 3-4 i.v. Amoxicillin/clavulansyre 500 mg x 3 p.o. Penicillinallergi: Ceftriaxon 1 g x 1 i.v. moxifloxacin 400 mg x 1 p.o.
Svin	Ceftriaxon 1 g i.v.	Amoxicillin/clavulansyre 500 mg x 3 p.o. Penicillinallergi: Ciprofloxacin 500mg x 2 p.o.	Ceftriaxon 1 g x 1 i.v. Amoxicillin/clavulansyre 500 mg x 3 p.o. Penicillinallergi: Ciprofloxacin 500mg x 2 p.o.
Krybdyr og padder	Ceftriaxon 1 g i.v.	Ciprofloxacin 500mg x 2 p.o.	Ceftriaxon 1 g x 1 i.v. Ciprofloxacin 500 mg x 2 p.o.
Sæler	Doxycyclin 200 mg p.o.	Doxycyclin 200 mg/dg p.o. fordelt på 1-2 doser	Doxycyclin 200 mg/dg fordelt på 1-2 doser
Havdyr og fisk	Ciprofloxacin 400 mg i.v./500 mg p.o.	Ciprofloxacin 500 mg x 2 p.o.	Ciprofloxacin 400 mg x 2 i.v. Ciprofloxacin 500 mg x 2 p.o.
Andre eksotiske dyr	Specialistopgave. Kontakt altid Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.		

11. ANTIBIOTIKA GENERELT

Åbne sår	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sår uden større kontaminering kræver IKKE antibiotisk behandling, blot almindelig sårbehandling. 2. Sår (bortset fraset bidsår), hvor antibiotisk behandling er indiceret, behandles
----------	--