

Diagnose	Hofte og femur
<p><b>Hofte nær fraktur</b></p> <p><b>DS72.0</b> Fractura colli femoris uden specifikation</p> <p><b>DS72.1</b> Fractura pertrochanterica femoris</p> <p><b>DS72.1A</b> Fractura intertrochanterica femoris</p> <p><b>DS72.1B</b> Fractura trochanterica femoris</p> <p><b>DS72.2</b> Fractura subtrochanterica femoris</p> <p><b>DS72.3</b> Fractura corporis femoris</p> <p><b>DS73.4</b> Fractura supracondylaris et condyli femoris</p>	<p><b>Initiale procedurer ved hofte nære femur frakturer</b></p> <p><u>Primære undersøgelser</u></p> <p>Patienten undersøges for evt hofte nært brud klinisk. (løfte ben strakt, direkte og indirekte ømhed, fejlstilling af ben – forkortet/udadroteret/indadroteret.</p> <p>Hvis pt er tidligere hofteprotese opereret, kan der være mistanke om hofteprotese luxation og evt fraktur protesenært.</p> <p>Ved fraktur/luxation mistanke tilkaldes anæstesen til anlæggelse ultralydvejledt femoralis blok i inden rtg undersøgelsen.</p> <p>I forbindelse hermed skal der etableres iv-adgang og patienten skal monitoreres. (BT, Sat, Ekg)</p> <p>Smertestillende, hvis det er nødvendigt.</p> <p>Patienten konf. med mellemvagt og indlægges til behandling.</p> <p><b>Collum femoris-fraktur</b></p> <p>Udisloceret: Garden 1, Garden 2, &gt;20° posterior frakturvinkel</p> <p>Disloceret: Garden 3, Garden 4</p> <p>Caputbevarende kirurgi</p> <p>Faktorer tællende for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alder &lt;70 år</li> <li>Højt aktivitetsniveau</li> <li>Anatomisk reposition</li> <li>Stort caput/collumfragment</li> <li>Nedsat kognitiv funktion</li> <li>Kort forventet restlevetid</li> </ul> <p>Artroplastik</p> <p>Faktorer tællende for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alder &gt;70 år</li> <li>Stor posterior frakturvinkel</li> <li>Ikke reponérbar fraktur</li> <li>Lille caput/collumfragment</li> <li>Artrose</li> <li>Osteoporose</li> </ul> <p>Frakturskred Non-union Caputnekrose</p> <p>Calcar intakt: Osteosyntese med parallelle implantater</p> <p>Calcar ikke intakt: Osteosyntese med glideskrue fæstnet til lateral skinne</p> <p>Lavere aktivitetsniveau: Hemialloplastik (+/- cementeret)</p> <p>Højere aktivitetsniveau el. artrose: Total alloplastik (+/- cementeret)</p> <p>Sengeliggende: Girdlestone</p> <p><b>Pertrokanter fraktur</b></p> <p>Stabil</p> <p>Ustabil</p> <p>Stabil: Evans 1, Evans 2</p> <p>Intakt støtte fra laterale cortex: Evans 3, Evans 4</p> <p>Manglende støtte fra laterale cortex / komminut fraktur: Evans 3, Evans 4, Evans 5, Evans 5</p> <p>Glideskrue fæstnet til lateral skinne</p> <p>Glideskrue fæstnet til marvssøm</p>